

Übungen zur Vorlesung

Dynamische Systeme

Aufgabenblatt 5

Aufgabe 1:

a) Zeigen Sie: Der 2-dimensionale Cantor-Staub $\Lambda = C \times C$ (mit der Standard-Cantormenge C) ist eine hyperbolische Menge für die G-förmige Hufeisen-Büroklammer $f : U \rightarrow M$, mit

$$f = \begin{cases} (3x, y/3) & x \leq 4/10 \\ (3x - 2, y/3 + 2/3) & x \geq 6/10, \end{cases}$$

$U =$ offene ε -Umgebung von $[0, 1] \times ([0, 1/3] \cup [2/3, 1])$, und $M = \mathbb{R}^2$.

b) Ist Λ lokal maximal? (Beweis oder Widerlegung)

Aufgabe 2:

Zeigen Sie: Eine lokal maximale hyperbolische Menge Λ , welche minimal ist (jedes Orbit von $x \in \Lambda$ ist dicht in Λ), besteht aus genau einem periodischen Orbit.

Aufgabe 3:

Zeigen Sie: Wenn Λ eine lokal maximale hyperbolische Menge für f ist und $f|_{\Lambda}$ die Spezifikationseigenschaft hat, dann ist $f|_{\Lambda}$ topologisch mischend.

Aufgabe 4:

Finden Sie einen Diffeomorphismus $f : U \rightarrow M$, so dass $NW(f) \cap \Lambda \neq NW(f|_{\Lambda})$. Hierbei bezeichnet $NW(f) := \{x \in U \mid \forall V \text{ offen}, x \in V \exists N \in \mathbb{N} : V \cap f^N(V) \neq \emptyset\}$ die Menge der nichtwandernden Punkte von f und analog $NW(f|_{\Lambda})$ diejenigen der Einschränkung von f .