

## Blatt 0 (Präsenzübung)

### Übung 0.1 Einheitssphären

Erinnern Sie sich an die Metriken  $d_i$  auf  $\mathbb{R}^n$  für  $i = 1, 2, \infty$  mit

$$d_1(x, y) := \sum_{j=1}^n |x_j - y_j|$$
$$d_2(x, y) := \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2}$$
$$d_\infty(x, y) := \max_{j=1, \dots, n} |x_j - y_j|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Skizzieren sie die Einheitssphären  $\partial B_1(0) := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid d_i(x, 0) = 1\}$  für  $i = 1, 2, \infty$  und  $n = 2$ .

### Übung 0.2 Geomatikum-Metrik

Wir definieren für  $a, b \in \mathbb{N}_{\geq *}$  die folgende Metrik:  $d(a, b) = |b - a|$  wenn  $a - b$  gerade ist.  $d(a, b) = |b + a|$  wenn  $a - b$  ungerade ist. Sowie  $d(a, *) = d(*, a) = a$  und  $d(*, *) = 0$ .

Zeigen Sie, dass  $d$  eine Metrik ist.

Warum könnte man sie als Geomatikum-Metrik bezeichnen? Wie könnte man die Metrik noch realistischer machen?

### Übung 0.3 Definition von Metriken

Zeigen Sie, dass  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  eine Metrik definiert, wenn gilt:

1.  $d(x, y) = 0$  genau dann, wenn  $x = y$ .
2.  $d(x, y) = d(y, x)$  für alle  $x, y \in X$ .
3.  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  für alle  $x, y, z \in X$ .

### Übung 0.4 Besondere Dreiecksungleichung

Es sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum, in dem wir aber die Dreiecksungleichung durch die Eigenschaft ersetzen, dass für alle  $x, y, z \in X$

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}. \quad (1)$$

Zeigen Sie, dass  $(X, d)$  ein metrischer Raum ist.

Zeigen Sie, dass für alle  $r > 0$  und  $x \in X$  der Ball  $B_r(x)$  zugleich offen und abgeschlossen ist.

Können Sie ein Beispiel für eine Metrik mit der obigen Eigenschaft angeben?

### Übung 0.5 Metriken auf Produkten

(a) Seien  $(X_1, d_1)$  und  $(X_2, d_2)$  metrische Räume. Beweisen Sie, dass

$$d'((x_1, x_2), (x'_1, x'_2)) := d_1(x_1, x'_1) + d_2(x_2, x'_2),$$
$$d''((x_1, x_2), (x'_1, x'_2)) := \sqrt{d_1(x_1, x'_1)^2 + d_2(x_2, x'_2)^2} \quad \forall x_1, x'_1 \in X_1, x_2, x'_2 \in X_2$$

Metriken auf der Produktmenge  $X_1 \times X_2$  definiert.

(b) Es sei  $(X_n, d_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine abzählbare Familie von metrischen Räumen. Warum können die Definitionen aus Teil (a) nicht einfach übertragen werden, um auf  $X := \prod_{n \geq 0} X_n$  eine Metrik zu erhalten?

Zeigen Sie, dass

$$d(x, x') := \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(x_n, x'_n)}{1 + d_n(x_n, x'_n)}$$

eine Metrik auf dem Produkt  $\prod_{n \geq 0} X_n$  definiert. Hierbei sind  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  und  $x' = (x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$  Elemente aus  $X$ .