

## 9.5 Uneigentliche Integrale

**Ziel:** Berechne **uneigentliche Integrale**, d.h.

- Integrale über unbeschränkten Bereichen

$$\int_a^\infty f(x) \, dx \quad \int_{-\infty}^b f(x) \, dx \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx.$$

- Integrale über unbeschränkten Funktionen mit Singularitäten am Rand

$$\int_a^b f(x) \, dx \quad \text{wobei } f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig} \quad \text{oder } f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig}$$

## Lokale Integrierbarkeit und uneigentliche Integrale.

**Definition:** Eine Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $D \subset \mathbb{R}$  heißt **lokal integrierbar**, falls  $f$  über jedem kompakten Teilintervall  $[a, b] \subset D$  integrierbar ist.  $\square$

**Definition:** Ist eine Funktion  $f(x)$  lokal integrierbar über  $[a, \infty)$  bzw.  $(-\infty, b]$  bzw.  $(-\infty, \infty)$ , so definiert man

$$\int_a^\infty f(x) \, dx := \lim_{y \rightarrow \infty} \int_a^y f(x) \, dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) \, dx := \lim_{y \rightarrow -\infty} \int_y^b f(x) \, dx$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx := \int_{-\infty}^a f(x) \, dx + \int_a^\infty f(x) \, dx \quad \text{für } a \in \mathbb{R}.$$

 $\square$

## Lokale Integrierbarkeit und uneigentliche Integrale.

**Definition:** Ist eine Funktion  $f(x)$  lokal integrierbar über  $(a, b]$  bzw.  $[a, b)$  bzw.  $(a, b)$ , so definiert man

$$\int_a^b f(x) \, dx := \lim_{y \rightarrow a^+} \int_y^b f(x) \, dx$$

$$\int_a^b f(x) \, dx := \lim_{y \rightarrow b^-} \int_a^y f(x) \, dx$$

$$\int_a^b f(x) \, dx := \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx \quad \text{für } c \in (a, b).$$

## Ein Beispiel.

Betrachte das uneigentliche Integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} \, dx.$$

Wegen

$$\int \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{x^{\alpha-1}} + C & \text{für } \alpha > 1 \\ \log(|x|) + C & \text{für } \alpha = 1 \end{cases}$$

konvergiert das uneigentliche Integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} \, dx$$

für  $\alpha > 1$  und divergiert für  $\alpha = 1$ . ■

**Ein weiteres Beispiel.** Betrachte das uneigentliche Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|e^{-x^2} dx.$$

Es gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|e^{-x^2} dx = -\int_{-\infty}^0 xe^{-x^2} dx + \int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx = 2 \int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx,$$

und weiterhin

$$\begin{aligned} \int_0^y xe^{-x^2} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{y^2} e^{-u} du && \text{mit } u = x^2 \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^{-y^2}) \rightarrow \frac{1}{2} && \text{für } y \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Somit gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|e^{-x^2} dx = 1$$



**Konvergenzkriterien.**

**Satz:** Sei  $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  lokal integrierbar. Dann gilt:

(a) Das uneigentliche Integral  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  existiert genau dann, wenn gilt

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists C > a : \forall z_1, z_2 > C : \left| \int_{z_1}^{z_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

(b) Ist das uneigentliche Integral **absolut konvergent**, d.h.

$$\int_a^{\infty} |f(x)| dx$$

konvergiert, so konvergiert auch das uneigentliche Integral

$$\int_a^{\infty} f(x) dx.$$



## Majorantenkriterium.

**Satz:** Sei  $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  lokal integrierbar. Dann gilt:

(c)

$$\forall x : |f(x)| \leq g(x) \text{ und } \int_a^\infty g(x) \, dx \text{ konvergent}$$

$$\implies \int_a^\infty f(x) \, dx \text{ absolut konvergent}$$

(d) Weiterhin gilt folgende Umkehrung:

$$\forall x : 0 \leq g(x) \leq f(x) \text{ und } \int_a^\infty g(x) \, dx \text{ divergent}$$

$$\implies \int_a^\infty f(x) \, dx \text{ divergent.}$$

□

## Beispiel: Das Dirichlet-Integral

Betrachte das **Dirichlet-Integral**

$$I = \int_0^\infty \frac{\sin(x)}{x} \, dx.$$

Das Dirichlet-Integral ist konvergent, denn es gilt

$$\int_{y_1}^{y_2} \frac{\sin(x)}{x} \, dx = -\frac{\cos(x)}{x} \Big|_{y_1}^{y_2} - \int_{y_1}^{y_2} \frac{\cos(x)}{x^2} \, dx$$

und somit

$$\left| \int_{y_1}^{y_2} \frac{\sin(x)}{x} \, dx \right| \leq \frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \int_{y_1}^{y_2} \frac{1}{x^2} \, dx = \frac{2}{y_1} \rightarrow 0 \text{ für } y_1 \rightarrow \infty.$$

□

### Bemerkungen:

- Das Dirichlet-Integral ist *nicht* absolut konvergent;
- Das Dirichlet-Integral besitzt den Wert  $I = \pi/2$ .

□

## Beispiel: Das Exponentialintegral

- Betrachte das **Exponentialintegral**

$$\text{Ei}(x) := \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{t} dt \quad \text{für } x < 0.$$

Wegen  $\lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0$  gibt es ein  $C > 0$  mit  $|te^t| \leq C$  für alle  $t \in (-\infty, x]$ , und somit gilt

$$\left| \frac{e^t}{t} \right| = \frac{|te^t|}{t^2} \leq \frac{C}{t^2}.$$

Mit der Konvergenz des Integrals

$$\int_{-\infty}^x \frac{1}{t^2} dt$$

folgt die **absolute Konvergenz** des Exponentialintegrals  $\text{Ei}(x)$  für alle  $x < 0$  aus dem Majorantenkriterium. ■

## Beispiel: Die Gamma-Funktion.

Die **Gamma-Funktion**  $\Gamma : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ist definiert durch

$$\Gamma(x) := \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \quad \text{für } x > 0.$$

Beachte: Für  $0 < x < 1$  ist der Integrand von  $\Gamma(x)$  singulär. Mit

$$|e^{-t} t^{x-1}| \leq t^{x-1} \quad \text{für } 0 < t \leq 1$$

folgt jedoch in diesem Fall

$$\int_{\varepsilon}^1 t^{x-1} dt = \frac{1}{x} t^x \Big|_{t=\varepsilon}^{t=1} = \frac{1}{x} (1 - \varepsilon^x) \rightarrow \frac{1}{x} \quad \text{für } \varepsilon \rightarrow 0+.$$

Die Konvergenz bei  $t = \infty$  zeigt man wie beim Exponentialintegral:

$$|e^{-t} t^{x-1}| = \left| \frac{e^{-t} t^{x+1}}{t^2} \right| \leq \frac{C}{t^2} \quad \text{für } 1 \leq t \leq \infty.$$

Mit dem Majorantenkriterium folgt die absolute Konvergenz von  $\Gamma(x)$  für  $x > 0$ .

## Weitere Bemerkungen zur Gamma-Funktion.

Die Gamma-Funktion erfüllt die Funktionalgleichung

$$\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x) \quad x > 0$$

und es gilt

$$\Gamma(1) = 1.$$

□

**Folgerung:** Es gilt

$$\Gamma(n) = (n-1)! \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

■

## 9.6 Parameterabhängige Integrale

**Beispiel:** Die **Gamma-Funktion**

$$\Gamma(x) := \int_0^{\infty} f(x, t) dt = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

**Zunächst:** Parameterabhängige *eigentliche* Integrale.

Sei  $f : I \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I \subset \mathbb{R}$ , so dass  $f$  für festes  $x \in I$  als Funktion von  $y$  integrierbar über  $[a, b]$  ist:

$$F(x) := \int_a^b f(x, y) dy.$$

**Fragen:**

- Ist die Funktion  $F(x)$  *stetig*, wenn  $f(x, y)$  stetig ist?
- Ist die Funktion  $F(x)$  *differenzierbar*, wenn  $f(x, y)$  nach  $x$  differenzierbar?

## Stetigkeit parameterabhängiger Integrale.

**Satz:** Ist  $f(x, y)$  stetig auf  $I \times [a, b]$ , so existiert das Integral

$$F(x) := \int_a^b f(x, y) \, dy$$

für alle  $x \in I$ , und  $F(x)$  ist stetig auf  $I$ .

**Beweis:** Sei  $x_0 \in I_0 \subset I$ , so dass  $I_0 \subset I$  kompakt. Dann ist  $f(x, y)$  auf dem Kompaktum  $I_0 \times [a, b]$  gleichmäßig stetig. Daher gibt es zu  $\varepsilon > 0$  ein  $\delta > 0$  mit

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x, y) - f(x_0, y)| < \varepsilon \quad \text{für } x, x_0 \in I_0 \text{ und alle } y \in [a, b].$$

Mit diesem  $\delta$  und  $|x - x_0| < \delta$  für  $x, x_0 \in I_0$  folgt dann

$$|F(x) - F(x_0)| = \left| \int_a^b (f(x, y) - f(x_0, y)) \, dy \right| \leq \int_a^b |f(x, y) - f(x_0, y)| \, dy < \varepsilon(b-a).$$

Somit ist  $F$  stetig in  $x_0$ . Da  $x_0$  beliebig gewählt, ist  $F$  auf ganz  $I$  stetig. ■

## Differenzierbarkeit parameterabhängiger Integrale.

**Satz:** Ist  $f(x, y)$  stetig auf  $I \times [a, b]$  und nach  $x$  stetig (partiell) differenzierbar, so ist auch  $F(x)$  auf dem Intervall  $I$  stetig differenzierbar, und es gilt

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \, dy.$$

**Beweis:** Für  $x, x_0 \in I$ ,  $x \neq x_0$ , folgt mit dem Mittelwertsatz

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \int_a^b \frac{f(x, y) - f(x_0, y)}{x - x_0} \, dy = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y) \, dy \quad \text{für ein } \xi \in [x_0, x],$$

und damit weiterhin

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \int_a^b \lim_{\xi \rightarrow x_0} \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y) \, dy = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y) \, dy.$$

Somit ist  $F$  differenzierbar in  $x_0$ .

Da  $x_0$  beliebig gewählt, ist  $F$  auf ganz  $I$  differenzierbar. ■

## Zwei Beispiele.

**Beispiel 1:**

$$F(x) = \int_1^{\pi} \frac{\sin(tx)}{t} dt \implies F'(x) = \int_1^{\pi} \cos(tx) dt.$$

**Beispiel 2:** Die **Bessel-Funktion**

$$J_n(x) := \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin(t) - nt) dt, \quad \text{für } n \in \mathbb{Z},$$

$$J_n'(x) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(t) \cdot \sin(x \sin(t) - nt) dt,$$

$$J_n''(x) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2(t) \cdot \cos(x \sin(t) - nt) dt.$$

**Bemerkung:** Die Bessel-Funktion  $J_n(x)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , ist (eine) Lösung der **Besselschen Differentialgleichung**

$$x^2 y''(x) + xy'(x) + (x^2 - n^2)y(x) = 0 \quad \text{für } n \in \mathbb{Z}.$$

**Beweis:** Übung (mit partieller Integration). □