

## Analysis III für Studierende der Ingenieurwissenschaften

### Blatt 1

#### Aufgabe 1:

Für die folgenden Funktionen  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  berechne man das Gradientenfeld  $\nabla f(x, y)$  und skizziere die Höhenlinien  $f^{-1}(C) := \{(x, y)^T : f(x, y) = C\}$  von  $f$  für verschiedene Werte von  $C$ .

a)  $f(x, y) = x - 2y,$

b)  $f(x, y) = xy,$

c)  $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, (x, y) \neq (0, 0),$

d)  $f(x, y) = y^2(x - 1) + x^2(x + 1).$

**Hinweis zu d):** Verwenden Sie die MATLAB-Funktionen *meshgrid*, *mesh*, *surf*, *contour*, *gradient* und *quiver*.

#### Aufgabe 2:

a) Für die Funktionen

$$f(x, y) := \ln(\sqrt{x^2 + y^2}), \quad g(x, y) := \arctan(y/x)$$

gebe man jeweils den (maximalen) Definitionsbereich an, berechne alle partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung und bestimme  $\Delta f$  und  $\Delta g$ .

b) Die *Tangentialebene* an den Graphen einer differenzierbaren Funktion  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  im Punkt  $(x^0, y^0) \in D_f \subset \mathbb{R}^2$  ist gegeben durch

$$z = f(x^0, y^0) + f_x(x^0, y^0)(x - x^0) + f_y(x^0, y^0)(y - y^0)$$

Man bestimme jeweils die Tangentialebene von  $f$  und  $g$  aus a) im Punkt  $(x^0, y^0) = (2, 1)$ .

**Aufgabe 3:**

Gegeben seien die Funktion  $f, g, h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  mit

$$f(x, y) := \sin^2(xy), \quad g(x, y) := \sqrt{y^2 + 4} \ln(x^2 + 1), \quad h(x, y) := y \sqrt{2x^2 + y^2}.$$

- a) Man berechne die partiellen Ableitungen erster Ordnung dieser Funktionen.
- b) Man überprüfe, ob  $h$  eine  $C^1$ -Funktion ist.
- c) Man berechne die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung  $h_{xy}$  und  $h_{yx}$  und überprüfe, ob  $h$  eine  $C^2$ -Funktion ist.

**Aufgabe 4:**

Für zwei parallel geschaltete Ohmsche Widerstände  $R_1$  und  $R_2$  ergibt sich nach den KIRCHHOFFSchen Gesetzen ein Gesamtwiderstand  $R$  mit  $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ .

- a) Man veranschauliche sich die hierdurch gegebene Funktion  $R = f(R_1, R_2)$  durch Skiz-zierung einiger Höhenlinien (etwa für  $R = 1, 1/2, 1/4, \dots$ ).
- b) Man berechne die partiellen Ableitungen erster Ordnung und den Gradienten  $\nabla f(R_1, R_2)$ .
- c) Man zeige, dass der Gradient  $\nabla f$  im Punkt  $(2, 2/3)$  senkrecht steht auf der Höhenlinie durch diesen Punkt.

**Abgabetermine:** 25–29.10. 2004 vor der Übung.