

## Analysis III für Studierende der Ingenieurwissenschaften

### Blatt 7

#### Aufgabe 25:

- a) Überprüfen Sie die notwendigen Bedingungen für die Existenz eines Potentials  $\varphi(\mathbf{x})$  zum Kraftfeld  $\mathbf{K} := (2xz^3 + 6y, 6x + 2yz, 3x^2z^2 + y^2)^T$  und berechnen Sie  $\varphi$  gegebenenfalls. Ermitteln Sie die Arbeit, die bei der Bewegung eines Massenpunktes von  $A = (1, -1, 1)$  nach  $B = (2, 1, -1)$  in diesem Kraftfeld verrichtet wird.
- b) Berechnen Sie das Kurvenintegral  $\int_{\mathbf{c}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$  für das Vektorfeld  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) := (x^2y, x)^T$ , wobei  $\mathbf{c}$  den im positiven Sinn durchlaufenen Rand des Dreiecks  $\Delta : (0, 0), (1, 0), (1, 2)$  bezeichne. Bestätigen Sie für dieses Beispiel den Integralsatz von Green.

#### Aufgabe 26:

- a) Bestimmen Sie die Oberfläche des Paraboloidstückes

$$P := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 2, z = 2 - (x^2 + y^2)\}.$$

- b) Berechnen Sie den Fluss des Vektorfeldes  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) := (xz, yz, yz^2)^T$  durch das Kugelschalenstück  $K := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4, x^2 + y^2 \leq 1, z \geq 0\}$ .  
*Hinweis:* Die Flächennormale der Kugel weise nach außen. Verwenden Sie zur Parametrisierung Polarkoordinaten für  $(x, y)$ .

#### Aufgabe 27:

Gegeben sei der Körper  $K := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq 1, x^2 + y^2 \leq z^2\}$  und das Vektorfeld  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) := (x^3 + yz, y^3 + x, z^2)^T$ .

- a) Skizzieren Sie  $K$  und geben Sie Parametrisierungen für die beiden glatten Flächenstücke  $F_1$  und  $F_2$  an, die  $K$  beranden.
- b) Berechnen Sie das Volumenintegral  $\int_K \operatorname{div} \mathbf{f} d\mathbf{x}$  sowie die einzelnen Flüsse von  $\mathbf{f}$  durch die Flächenstücke  $F_1$  und  $F_2$ . Bestätigen Sie damit für dieses Beispiel den Gaußschen Integralsatz.

**Aufgabe 28:**

- a) Zeigen Sie: Ist  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ ,  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$  ein divergenzfreies  $C^1$ -Vektorfeld, so wird zu einem (festen) Punkt  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$  durch

$$\mathbf{v}(x, y, z) := \left( \int_{a_3}^z f_2(x, y, \zeta) d\zeta - \int_{a_2}^y f_3(x, \eta, a_3) d\eta, - \int_{a_3}^z f_1(x, y, \zeta) d\zeta, 0 \right)^T$$

ein so genanntes *Vektorpotential*  $\mathbf{v}(\mathbf{x})$  definiert, d.h. es gilt  $\operatorname{rot}(\mathbf{v}) = \mathbf{f}$ .

- b) Zeigen Sie, dass das Vektorfeld  $\mathbf{f} := (x(z^2 - y^2), y(x^2 - z^2), z(y^2 - x^2))^T$  divergenzfrei ist und berechnen Sie ein Vektorpotential zu  $\mathbf{f}$ .
- c) Man verwende den Stokesschen Integralsatz zur Berechnung des Flusses von  $\mathbf{f}$  durch die obere Kugelschale

$$K := \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2} \}.$$

**Abgabetermine:** 31. 1. – 4. 2. 2005 **vor** der Übung.